

男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン2017年版

Clinical Question (CQ) より

CQ2 デュタステリドの内服は有用か？

A 男性型脱毛症 = (A) 行うよう強く勧める
女性型脱毛症 = (D) 行うべきではない

CQ7 カルプロニウム外用液は有用か？

A (C1) 行ってもよい

CQ3 ミノキシジルの外用は有用か？

A (A) 行うよう強く勧める

※リアップなど5%ミノキシジル外用液が市販されています。ネットで外国産15%外用液を推奨するところもありますが、安全性が確保されているものではありません。

CQ14 ミノキシジルの内服は有用か？

A (D) 行うべきではない

※ネット AGA 診療では外国産ミノキシジル内服を推奨していますが、診療ガイドラインでは「(D) 行うべきではない」という見解になっています。

服用不可

- ・ 同種の薬剤に過敏症の方
- ・ 重症の肝障害の方
- ・ 女性や小児（経皮吸収されるので触れない場所に保管）

重要な注意

- ・ 半年後、前立腺癌検査 (PSA) が約50%低くなる → 見逃しリスク
- ・ 性欲減退・勃起不全（約1%）

注意

- ・ 安全性が高い薬品ですが、稀にアレルギーが出る場合があります。
塗布部分が染みたり、発汗などがあればご相談ください。



初回は受診

- ①問診と診察をし、安全性のご説明をします。
- ②以後は、問題がなければ、来院または電話再診で安全性を確認のうえ、ご希望によって最長 90 日分まで送付いたします。
（プライバシー保護のうえ段ボール茶封筒で郵送）
- ③分からないことは気軽に電話でお尋ねください。

オンライン診療

Coming Soon... 準備でき次第、ご連絡します。