

服用不可 ※医師の指示に沿った慎重投与

- ・狭心症・心不全・不整脈・心筋梗塞などで内服が欠かせない方
- ・高血圧 (170/100 以上) または低血圧 (90/50 未満) の方
- ・3 ヶ月以内の心筋梗塞、または 6 ヶ月以内に脳梗塞・脳出血をされた方
- ・重度の腎障害、重度の肝障害の方
- ・肺高血圧症の薬を欠かせない方

併用注意 ※必ずご相談ください

真菌症、抗生剤 (クラリスロマイシン)、C 型肝炎治療薬、グレープフルーツジュース、AIDS 治療薬、抗けいれん剤、抗結核薬、抗不整脈薬、降圧剤など

副作用

- ・過敏症 (ごく稀)
- ・その他 (気になるときはご相談ください)

服用方法

食事に関係なく、毎日、飲む時間をある程度決めて服用してください。



初回は受診

- ① ネット予約・問診票には「院長に直接、相談」にチェック
問診と診察をし、安全性のご説明をします。
- ② 以後は、問題がなければ、来院または電話再診で安全性を確認のうえ、ご希望によって最長 90 日分まで送付いたします。
(プライバシー保護のうえ段ボール茶封筒で郵送)

オンライン診療

Coming Soon... 準備でき次第、ご連絡します。